

El peso al nacer, destete y a los 16 meses, resultaron ser parámetros competitivos con respecto a explotaciones con otras opciones raciales en las condiciones tropicales de Colombia; esto induce a los productores a definir criterios de selección de novillas y reproductores con base en estas características.

Bibliografía

Arias J., Balcázar A, Hurtado R. (1990) Sistemas de producción bovina en Colombia. *Coyuntura Agropecuaria* 6, (4) ,83-119.

Gallego J.L., Martínez R.A, Moreno F.L. (2006) Índice de consanguinidad y caracterización fenotípica y genética de la raza bovina criolla blanco orejinegro. *Rev. Corpoica* 7, (1).

López A., Saldarriaga O, Arango A, Rugeles M, Zuluaga F, Olivera M, Bermúdez N, Bedoya G, Ossa J. (2001) Ganado Blanco Orejinegro (BON): Una alternativa para la producción en Colombia. *Rev. Col Cienc Pec* 14,(2).

Marcondes C., Bergmann G, Eler P, Ferraz S, Pereira C, Penna M. (2000) Análisis de alguns critérios de seleção para características de crescimento na raça Nelore. *Arq Bras Med Vet Zootec* 52, 83-89.

Ossa G., Pérez J. (2002) Efecto del medio y la herencia sobre el peso al nacer, destete y 16 meses de edad de la raza Romosinuano. *Informe Corpoica Bogotá*.

Pimenta Filho C.E., Martins A.G, Sarmiento R.J.L. (2001) Estimativas de heredabilidade de efeitos direto e materno de características de crescimento de bovinos Guzerá, no Estado da Paraíba. *Rev. Bras Zotec* 30, (4) 1220-1223.