

Morell, por su apoyo en nuestro trabajo de campo. Marta Caballera, Andrew Kapata, Edwell S. Mwaanga y Silvia Valenzuela contribuyeron, con los autores, a la obtención “in situ” de las medidas de la raza africana “Fat-tailed”.

Bibliografía

- Avellanet, R., Jordana, J. 2003. Caracterización morfológica de la raza ovina xisqueta por comarcas. *ITEA (vol. Extra)* 24 (II), 528-530.
- Casanova, J., Ferret, A., García, O., Ramon J. 1986. Estudio zoométrico realizado con ovinos de raza Ripollesa. *Arxius de l'ESAB, Sèrie Quatre* 7, 33-40.
- Hammer, Ø., Harper, D.A.T., Ryan, P.D.. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. *Palaeontologia Electronica* 4 (1). En: http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/issue1_01.html.
- Parés, P.-M. 2007. Análisis biométrico y funcional de la raza ovina aranesa. *REDVET Revista electrónica de Veterinaria* VIII (1), 1-8.
- Parés, P.-M-, Jordana, J. 2007. La oveja “Roja Rossellonenca”: una aportación a su caracterización biométrica. *Pequeños Rumiantes* 8 (3), 37-41.
- Peña, F., Domenech, V., Aparicio, F., Cruz, M. 1990. Estudio biométrico en la raza ovina segureña. *Arch. Zootec.* 39, 249-261.