

cabra criolla formoseña, aunque muy similar éste al hallado por Vera *et al.* (2003) del 60-65% para igual época del año.

Respecto al Porcentaje de Destete, el valor hallado en este estudio del 82,61% fue inferior al encontrado por Lanari *et al.* (2000) del 95% para la cabra criolla neuquina.

Los valores hallados para prolificidad en Laguna Yema de 1,71 cabritos/cabra parida son superiores al promedio de 1,48 cabritos/cabra reportado por Dayenoff *et al.* (2003) en Mendoza.

Conclusión

El desempeño de la cabra Criolla Formoseña, adaptada al clima y condiciones de manejo de Laguna Yema, fue acorde a lo esperado, habiendo similares rendimientos reproductivos entre ésta y las razas exóticas con mayores requerimientos para explotar su potencial genético.

El presente trabajo aporta datos iniciales a la caracterización reproductiva, de suma importancia para el proyecto mayor del que éste forma parte "Caracterización productiva de pequeños rumiantes en el oeste de Formosa" - Proyecto de investigación acreditado por la Secretaría General de Ciencia y Técnica de la UNNE. PI: B015/09. Resol N° 153/10 - C.S.

Bibliografía

- Caries, A. and Schwartz, H.J. (1982) Factors affecting and mortality in a small East African goat flock in a nomadic pastoral system (The rendille of northern Kenya) En: Proceedings of the Third International Conference on goat production and disease. January 10-15 Tucson. Arizona U.S.A. Dairy Goat Journal Publishing Company. p 344.
- Dayenoff, P.; Macario, J. y Mandarino, R. (2003). "Evolución del peso de la cabra adulta en el área de Malargüe". Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 23, supl. 1, pp: 286-287.
- De la Vega, A. C.; Ruiz, R.; Fernández, J. L. y Rabasa, A. (2003) "Peso al destete de los cabritos criollos y su relación con la producción de leche de la cabra". Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 23, supl. 1, pp: 309.
- Gea, G. S. y Mondino, G. C. (1995) Proyecto subsidiado por Resolución Rectoral U.N.R.C. N° 300/95.
- Duque, P. (1982) Reproduction and production performance in goats in the district of Europa, Portugal. En: Proceeding of the Third International Conference on Goat Production and Disease. January 10 to 15 Tucson. Arizona U.S.A. Dairy Goat Journal Publishing Company. p. 571.
- Fernández, J. L.; Ruiz, R.; Rabasa, A.; Saldaño, S. A.; Holgado, F. D. y Poli, M. A. (2003) "Peso al nacimiento de cabritos criollos Serranos. Factores que lo afectan". Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 23, supl. 1, pp: 307-308.
- Lanari, M.R.; Domingo, E. Pérez Centeno, M.J. (2000). El sistema rural de la Cabra Criolla Neuquina en el norte de la Patagonia. En: La biodiversidad en los recursos genéticos animales iberoamericanos. CYTED, Programa XII-H Biodiversidad, Ed. R. Pérezgrovas. 10 p. en prensa.
- Mellado, Miguel; Olivares Lorenzo, López Ramiro, Mellado Jesús. (2004) "Influencia de la lactancia, peso corporal y reservas de lípidos a la fecundación sobre el comportamiento reproductivo de cabras en agostadero". Agrocienza 35, 355-361.
- Vera, T. A.; Chagra Dib, E. P.; Leguiza, H. D. Y Valdivia, C. L. (2003). "Desempeño reproductivo de Cabras Criollas biotipo riojano con servicios en las cuatro estaciones del año". Rev. Arg. Prod. Anim. Vol. 23, supl. 1, pp: 268-269.