



Programación Declarativa
Ingeniería Informática
Especialidad de Computación
Cuarto curso. Primer cuatrimestre



Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba

Curso académico: 2014 - 2015

Práctica número 1.- Introducción al lenguaje Scheme

• **Observaciones:**

- Sólo se han de presentar los ejercicios marcados con un **asterisco (*)**, que deberán estar **contenidos en un mismo fichero**.
- Todas las **funciones** que se escriban deben tener un **comentario de cabecera** que contenga, al menos, la siguiente información:
 - Nombre de la función
 - Objetivo
 - Descripción de la solución (salvo que se deduzca de forma inmediata)
 - Significado de los parámetros de entrada.
 - Significado del resultado que devuelve.
 - Funciones auxiliares a las que llama.

1. **Constantes y literales:** teclea las siguiente constantes y literales (creados con la forma especial **quote** o con la comilla simple) y comprueba el resultado devuelto por el intérprete de *Scheme*:

; Los comentarios comienzan con el símbolo de "punto y coma"

```
#t           ;; constante lógica de verdadero  
3           ;; número entero  
20.5       ;; número real  
"ejemplo de cadena" ;; se utilizan comillas dobles para delimitar las cadenas  
'dato      ;; no debes olvidar las comillas de cierre  
'dato      ;; se utiliza la comilla simple para crear un literal  
  
(quote dato) ;; también se puede utilizar quote para crear un literal  
dato        ;; la variable dato no es un literal  
            ;; y producirá un error porque posee no todavía un valor  
#t          ;; las constantes lógicas también son literales  
(quote #t)  ;;  
'3         ;; los números también son literales  
(quote 3)   ;;  
20.5       ;;  
(quote 20.5) ;;  
(quote "ejemplo de cadena") ;; una cadena también es un literal
```

(+ 2 3) ;; expresión aritmética con notación prefija
 '(+ 2 3) ;; la expresión aritmética se convierte en un literal y "no" se evalúa

(quote (+ 2 3)) ;; la expresión aritmética se convierte en un literal y "no" se evalúa
 '(a b c) ;; lista de literales
 (quote '(a b c)) ;; otra forma de crear una lista de literales
 '(Ana Luis Juan) ;; lista de literales
 (quote (Ana Luis Juan)) ;; otra forma de crear una lista de literales

2. Teclea las siguientes expresiones aritméticas y comprueba el resultado de cada una de ellas.

; **Siempre** se debe **separar** el operador de los argumentos
 (+ 2 3)
 ;; Si no se separa el operador del argumento, se producirá un **error**
 (+2 3)

(+ 0.1)	(+ 0.001)	(+ 0.00000001)	(+ 3)
(+ 3 4)	(+ 3 4 5)	(+ 3 4.)	(+ 3 4.0)
(+)			
(- 2)	(- 10 2)	(- 10 3 1)	(- 10 3. 1)
(* 2)	(* 2 3 4)	(* 2.0 3 4)	(*)
(/ 5)	(/ 5.)	(/ 10 2)	(/ 8 3)
(/ 8. 3)	(/ 8 3.0)		

;; Aproximación racional al número π

(/ 355 113)

;; Aproximación al número π con seis decimales exactos.

(/ 355.0 113)

;; Se divide el primer argumento por el producto de los demás

(/ 60 3 5 4)

;; Combinación de operadores

(/ (* 9 4 3) (+ 3 2))

;; Expresión "sangrada" con tabuladores: más legible

(/

(* 9 4 3)

(+ 3 2)

)

3. Escribe las siguientes expresiones aritméticas con notación **prefija**:

a. $2 * 3 + 4 * (5 - 2)$

b. $\frac{(5 + 2)(5 - 2)}{5 * 4 - 3 * 6 + 1}$

4. Utiliza la forma especial **define** para declarar las siguientes variables y asignarles los valores que se indican:

Variable	Valor
iva	18
mayor-edad	18
meses	12
x	2.5
y	-12.3
z	$2x + y^3$
partido1	36.5
partido2	30.75
blanco	2.55
nulo	0.34
:: comprueba si el intérprete admite variables acentuadas	
abstención	100 - partido1 - partido2 - blanco - nulo
celsius	19.5
fahrenheit	$32.0 + (9.0/5.0) \text{ Celsius}$

5. ¿Qué ocurre si se aplica **set!** sobre una variable no definida previamente?
Por ejemplo:

(set! votantes 23732)

6. Define las siguientes variables y escribe en *Scheme* las expresiones asociadas a las **funciones matemáticas predefinidas** que se indican:

Variable	Valor
a	1
b	2
c	-3
pi	355.0 / 113.0 :: aproximación al número π con seis decimales exactos

Función	Significado	Ejemplo	Scheme
(abs x)	Valor absoluto de x	$abs(a^2 - b^2)$	
(sqrt x)	Raíz cuadrada de x	$\sqrt{b^2 - 4ac}$	
(square x)	Cuadrado de x	$(3a-2b+c)^2$	No existe
(exp x)	Exponencial de x	e^{2a}	
(log x)	Logaritmo neperiano de x	$log(e^a)$	
(expt x y)	Potencia: x^y	$(2a-b)^c$	
(sin x)	Seno de x	$sin(2 pi)$	
(cos x)	Coseno de x	$cos(pi/2)$	
(tan x)	Tangente de x	$tan(2 pi)$	
(asin x)	Arco seno de x	$asin(-0.5)$	
(acos x)	Arco coseno de x	$acos(0.5)$	
(atan x)	Arco tangente de x	$atan(1.0)$	
(atan x y)	Arco tangente de x/y	$atan(a/b)$	
(max x₁ x₂ ...)	Máximo de x ₁ x ₂ ...	$max(a,b,c)$	
(min x₁ x₂ ...)	Mínimo de x ₁ x ₂ ...	$min(2a,3b,4c)$	
(gcd x₁ x₂ ...)	Máximo común divisor	$gcd(12,15,-18)$	
(lcm x₁ x₂ ...)	Mínimo común múltiplo	$lcm(12,15,-18)$	

Función	Significado	Ejemplo	Scheme
(floor x)	Mayor entero no más grande que x	<i>floor(-2.7)</i> <i>floor(7.5)</i>	
(ceiling x)	Menor entero no más pequeño que x	<i>ceiling(-2.7)</i> <i>ceiling(7.5)</i>	
(truncate x)	Entero más próximo a x cuyo valor absoluto no es más grande que el valor absoluto de x	<i>truncate(-2.7)</i> <i>truncate(7.5)</i>	
(round x)	Entero más próximo a x; redondeando a un número par si x está justo entre dos enteros.	<i>round(-2.5)</i> <i>Round(7.5)</i>	
(modulo x y)	Resto de la división entera (Signo del divisor)	<i>modulo(12, 5)</i> <i>modulo(12, -5)</i> <i>modulo(-12, 5)</i>	
(quotient x y)	Cociente de la división entera	<i>quotient(12,5)</i>	
(remainder x y)	Resto de la división entera (Signo del dividendo)	<i>remainder(12, 5)</i> <i>remainder(12, -5)</i> <i>remainder(-12,5)</i>	

7. (*) Codifica las siguientes funciones:
- Función que convierta los grados Celsius en grados Fahrenheit.
 - Ejemplos: $0^{\circ}\text{C} \rightarrow 32^{\circ}\text{F}$, $100^{\circ}\text{C} \rightarrow 212^{\circ}\text{F}$
 - Función que convierta los grados Fahrenheit en grados Celsius.
 - Función que calcule el área de un rombo: $(D d) / 2$, donde D es la diagonal mayor y d la diagonal menor.
 - Observación:** comprueba si el intérprete distingue entre variables escritas en mayúsculas o minúsculas.
 - Función que calcule el volumen de una esfera: $(4/3) \pi r^3$
 - Función que calcule la superficie de una esfera: $4 \pi r^2$
 - Función que calcule el volumen de un cilindro circular, donde h es la altura y r es el radio de la base.

8. (*) Codifica las siguientes funciones sobre distancias en el plano euclídeo:

- a. **Distancia euclídea** entre dos puntos $P1 = (x1, y1)$ y $P2 = (x2, y2)$.

$$distancia - euclídea(P1, P2) = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$$

- b. **Distancia-Manhattan** entre dos puntos $P1 = (x1, y1)$ y $P2 = (x2, y2)$.

$$distancia - Manhattan(P1, P2) = |x2 - x1| + |y2 - y1|$$

- c. **Distancia-ajedrez** entre dos puntos $P1 = (x1, y1)$ y $P2 = (x2, y2)$.

$$distancia - ajedrez(P1, P2) = \max(|x2 - x1|, |y2 - y1|)$$

9. (*) Codifica las siguientes funciones sobre figuras geométricas
- Función denominada **área-rombo**
 - Los argumentos de la función serán las coordenadas de los vértices del rombo.
 - Se debe utilizar como función auxiliar la función **distancia-euclídea** definida en el ejercicio 8.a
 - Utiliza los comentarios para indicar en qué **orden** se han de introducir las coordenadas.
 - Función denominada **área-triángulo**
 - Ha de calcular el área de un triángulo utilizando **la fórmula de Herón**.
 - La función ha de recibir como argumentos a las coordenadas de los vértices de un triángulo.
 - Se debe utilizar como función auxiliar la función **distancia-euclídea** definida en el ejercicio 8.a
 - Utiliza los comentarios para indicar en qué **orden** se han de introducir las coordenadas
10. (*) Codifica las siguientes funciones:
- Función denominada **distancia-punto-recta**
 - Ha de calcular la distancia de un punto $P = (x_0, y_0)$ a una recta $r \equiv a x + b y + c = 0$ mediante la siguiente fórmula

$$d(P,r) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$
 - Función denominada **distancia-punto-recta-2**
 - Ha de calcular la distancia de un punto $P = (x_0, y_0)$ a la recta que pasa por otros dos puntos $P_1 = (x_1, y_1)$ y $P_2 = (x_2, y_2)$.
 - Sugerencia:**
 - En primer lugar, determina la recta $r \equiv a x + b y + c = 0$ que pasa por P_1 y P_2
 - A continuación, utiliza la función del apartado "a".
11. (*) Utiliza la forma especial **let** para codificar la función **área-trapecio**.
- Ha de calcular el área de un trapecio, pero recibiendo como argumentos las coordenadas de los vértices de forma ordenada.
 - Se han de utilizar las funciones auxiliares que permitan calcular la distancia entre dos puntos y la distancia de un punto a una recta que han sido previamente definidas.
 - Observación:**
 - Utiliza los comentarios para indicar en qué orden se han de introducir las coordenadas de los puntos.